



## SALICYLIC ACID 15%, LACTIC ACID 20%, RESORCIN 14%

ENERPEEL® JR är baserad på en etablerad och väldokumenterad kombinationspeel. Det modifierade receptet har stabil erfarenhet från 1941 och är en flitigt använd Peel. Resorcin innehållet liknar Phenol.

ENERPEEL® JR har primärt goda egenskaper vid behandling av Hyperpigmenteringar och Melasma men fungerar också som förbehandling till t ex TCA för att ge ökad behandlingseffektivitet. ENERPEEL® JR är mycket säker även vid behandling av mörkare hudtyper och lämpar sig därför för alla hudtyper. Eftersom Peelingen är en flerlayerspeeling kan den anpassas för graden av hudförändringar, fler appliceringar ger djupare verkan. ENERPEEL® JR kan även anpassas som peeling för hudfryngring och är då speciellt lämplig om pigmentförändringar finns. Den exfolierande effekten gör huden ljuskänslig varför det är nödvändigt med fullgott solskydd efter behandlingen.

**ENERPEEL® JR är speciellt anpassad för en rad olika indikationer:**

- Hyperpigmentering (inkl Postinflammatorisk, Melasma & Lentigo)
- Strier (Hudbristningar)
- Milda/Måttliga Ålderstecken (Linjer och rynkor)
- Förbehandling till TCA
- Hudfrynelse (Hudfryngring)



## BEHANDLINGEN

Behandlingen är en ytlig till ytlig/medium peeling och görs oftast som kur med 1 behandling per vecka alternativt varannan vecka beroende på indikation och hudens kvalitet. Behandlingen kan också göras som enstaka behandling i uppfräschande, hudfryngrande syfte.

## FÖRE/UNDER

Huden tvättas ren och därefter används en speciell vätska med "Preparatory solution" som förbereder huden för peelingen. Syran appliceras med hjälp av en borste jämnt över hudytan och en svidande känsla uppstår. Applikationen upprepas i flera lager för mer djupgående behandling. Efter verknings tiden neutraliseras syran med "Neutralizer" och avslutas med Terproline alt Aknicare kräm som ger ett nytt barriärskydd och återställer balansen samt solskydd.

## EFTER

Graden av rodnad i huden efter behandlingen står i relation till hudens kvalitet och behandlingens intensitet. Efter ett par dagar sker en efterfällning i olika grad beroende på hudkvalitet vid behandlingstillfället. Huden återställs dock relativt snabbt efter behandlingen och en ny behandling kan göras med 7-10 dagars intervall.

## PRODUKTER UNDER BEHANDLINGEN

Följ noga de anvisningar terapeuter/läkare ger och som hör till behandlingen inklusive de för- resp. efterbehandlande produkter. Informera om vilka ev. läkemedel och/eller andra preparat du använder.

## KONTRAIKATIONER

- Graviditet & amning
- Aktiv inflammatorisk dermatit
- Roacutane behandling de senaste 6 månaderna
- Allergi för Salicylsyra, Mjölksyra och/eller Resorcinol
- Ger tillfälligt ökad ljuskänslighet



Scientifically Proven Skin Solutions

© Derma ProMedical 2009  
www.synchroline-apoteket.se



Scientifically Proven Skin Solutions